

POVINNÉ OČKOVÁNÍ			NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ		
VĚK DÍTĚTE	NEMOC	OČKOVACÍ LÁTKA	VĚK DÍTĚTE	NEMOC	OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne nejpozději do 6. týdne	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)	BCG 10	od 4. dne nejpozději do 6. týdne	—	—
od 6. týdne	—	—	od 6. týdne	Rotavirové nákazy	Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2 měsíce)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B	Hexacima (1. dávka)	od 9. týdne (2 měsíce)	Pneumokoková onemocnění*/**	Prevenar 13, Synflorix (1. dávka)
				Rotavirové nákazy	Rotarix, Rotateq (2. dávka – měsíc po 1. dávce)
4 měsíce	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B	Hexacima (2. dávka – 2 měsíce po 1. dávce)	4 měsíce	Pneumokoková onemocnění*	Prevenar 13, Synflorix (2. dávka – 2 měsíce po 1. dávce)
				Rotavirové nákazy	Rotateq (3. dávka – měsíc po 2. dávce)
13. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix (1. dávka)	13. měsíc	—	—
mezi 11.–13. měsícem	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B	Hexacima (3. dávka)	mezi 11.–13. měsícem	Pneumokoková onemocnění*	Prevenar 13, Synflorix (3. dávka ve věku 11 až 15 měsíců)
od dovršení 5. do dovršení 6. roku	Spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix (2. dávka)	od dovršení 5. do dovršení 6. roku	—	—
v 5 letech věku dítěte	Záškrt, tetanus, černý kašel	Adacel (přeočkování)	v 5 letech věku dítěte	—	—
v 10 letech věku dítěte	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna	Boostrix polio (přeočkování)	v 10 letech věku dítěte	—	—
od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku dítěte	—	—	od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku dítěte	Onemocnění lidským papilomavirem*	Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 (2 dávky)

* Hrazeno ze zdravotního pojištění.

** U rizikových skupin dětí (do 6. měsíce věku) a u předčasně narozených dětí (< 37. gestační týden) doporučuje Česká vakcinologická společnost očkování ve schématu 3 + 1.

Pozn.: Očkování proti **meningokokovým onemocněním séro skupin ACWY**: od 6. týdne

(Nimenrix); od 2 let (Menveo). Očkování proti **meningokokovým onemocněním**

séro skupiny B: od 2. měsíce (Bexero) od 10 let (Trumenba).

Klíšťová encefalitida: od 12. měsíce (FSME Immun 0,25 ml, Encepur pro děti)